

Orthodontiepraktijk Schuttelaar

De damonsplint

De orthodontische apparatuur is bij jou verwijderd. De actieve behandeling met vaste apparatuur is daarmee ten einde gekomen.

De komende periode zullen alle tanden en kiezen moeten wennen aan hun nieuwe stand en goed vast moeten groeien in het bot van de boven- en onderkaak. Vaak hebben ze bovendien de neiging om terug te gaan staan in hun oude stand zoals die voor de behandeling was. Dit mag natuurlijk niet gebeuren, want dat zou zonde zijn!

Daarom krijg je nu nog een zogenaamde "nabehandeling" om te zorgen dat tanden en kiezen goed vastgroeien in de stand die ze nu hebben.

De damonsplint bestaat uit twee plastic hoesjes die aan elkaar vast zitten. Deze splint houdt hiermee je boven- en onderkaak in de juiste positie. Tegelijk zorgt de damonsplint ervoor dat je tanden en kiezen niet meer kunnen verschuiven. Het is een vreemd gevoel in je mond en je zult er zeker aan moeten wennen. In het begin kan het zijn dat de splint 's nachts uit je mond valt. Draag de splint dan een paar uur voor je gaat slapen zodat je er aan kan wennen. De splint gaat in de loop van de tijd vanzelf wat losser zitten.

De damonsplint draag je alleen 's nachts. Wanneer je de splint niet draagt, bewaar je hem in het bakje dat je hebt meegekregen. Het is de bedoeling dat je de splint blijft dragen totdat je bent uitgegroeid (ongeveer tot je 18^e).

Schoonmaken doe je 's morgens als je de splint uitdoet met een aparte tandenborstel/protheseborstel met koud water en handzeep of afwasmiddel. Maak de damonsplint **nóóit** schoon met warm water, hierdoor kan de beugel vervormen en in het ergste geval niet meer passen. Droog de splint altijd af voor je hem in het bakje legt. Komt er toch hardnekkige aanslag op, dan kun je bruistabletten gebruiken. Gebruik alleen Retainer Brite en geen tabletten voor kunstgebitten, deze zijn te agressief voor het materiaal van de beugel. Alleen bij zeer hardnekkige aanslag mag je de damonsplint in sla-azijn leggen. Doe dit zeker niet te vaak, hierdoor kan het materiaal van de beugel aangetast worden. Maak ook regelmatig het bakje schoon waar je de beugel in bewaard.

In de boven- en onderkaak is een stangetje geplaatst achter de voortanden.

Mocht het stangetje per ongeluk toch los gaan, dan moet je dit zo snel mogelijk melden. Indien je dat niet doet, gaan je tanden vrijwel zeker scheef staan in zeer korte tijd! Draag in dit geval de splint zo veel mogelijk om verschuivingen van tanden en kiezen te voorkomen.



like us on  Volg ons op 

www.orthoschuttelaar.nl



Hemelsley 14 • 6136 HM Sittard • T. 046-452 53 48

Orthodontiepraktijk Schuttelaar

Indien je damonsplint kapot gaat, moet je meteen contact opnemen voor de reparatie. Neem dan altijd de gipsmodellen mee. We kijken dan of we deze modellen kunnen gebruiken of dat we toch nieuwe afdrukken moeten maken. Bewaar de gipsmodellen dus goed! Zorg dat je de splint niet kwijt raakt. Mocht je de splint toch kwijtraken, dan zijn wij genoodzaakt een vervangingsnota te sturen.

Reparaties die uitgevoerd moeten worden door oneigenlijk gebruik van de beugel worden in rekening gebracht. Oneigenlijk gebruik is een beugel die kapot gaat door eigen "schuld". Denk hierbij aan het laten vallen van de beugel.

Het is heel belangrijk minimaal 2x per dag je tanden te poetsen!



like us on  Volg ons op 

www.orthoschuttelaar.nl



Hemelsley 14 • 6136 HM Sittard • T. 046-452 53 48